



暨南大学
JINAN UNIVERSITY

2022 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题 B 卷

招生专业与代码：口腔医学（专业学位） 105200

考试科目名称及代码：口腔综合 352

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、名词解释（共 20 小题，每题 3 分，共 60 分）

- 1.cervical ridge 2.切道斜度 3.下颌卸载反射 4. lateral movement
- 5.棘层松解 6.极性倒置 7. Mantle dentin 8. 不全角化
- 9. 非附着性龈下菌斑 10.莱氏综合征 11.internal resorption 12.Furuncle
- 13.切除活组织检查 14.骨膜上浸润法 15. 双臂卡环 16. Post
- 17. Border seal area 18.领凸角 19.深覆盖 20.阻抗中心

二、单项选择题（共 60 题，每题 2 分，共 120 分）

1. 下颌尖牙与上颌尖牙的区别中不正确的是：

- A. 下颌尖牙牙冠长而窄
- B. 下颌尖牙舌面窝较浅平
- C. 下颌尖牙牙尖偏远中
- D. 下颌尖牙牙根细长
- E. 下颌尖牙近中斜缘与远中斜缘相交呈直角

2. 关于副根管的描述正确的是：

- A. 相邻根管彼此相连的分支
- B. 髓室底至根分叉处的管道
- C. 垂直于主根管的分支
- D. 多见于双根管
- E. 在牙根表面的开口称为侧孔

3. 牙龈因失去食物的按摩而出现了失用性萎缩是由于：

- A. 牙冠牙合外展隙不明显
- B. 牙冠轴面突度过小
- C. 牙冠轴面无突度
- D. 牙冠轴面突度过大
- E. 牙冠牙合面副沟排溢道不明显

4. 所谓“解剖牙冠”是指：

- A. 显露于口腔的部分
- B. 牙体发挥咀嚼功能的部分
- C. 牙釉质覆盖的部分
- D. 牙骨质覆盖的部分
- E. 牙龈缘以上的部分

5. 上颌第一磨牙牙合面呈斜方形，下列描述正确的是：
A. 近中颊牙合角为锐角 B. 远中舌牙合角为钝角
C. 近中舌牙合角为锐角 D. 远中颊牙合角为锐角
E. 近中颊牙合角为钝角
6. 前牙独有的解剖特征为：
A. 横嵴 B. 牙窝 C. 斜嵴 D. 第五牙尖 E. 舌隆突
7. 最能代表下颌、颞下颌关节及其韧带和咀嚼肌功能潜力的下颌运动是：
A. 咀嚼运动 B. 吞咽运动 C. 习惯性开闭口运动
D. 边缘运动 E. 髁突运动
8. 下列哪一项不是下颌运动控制因素：
A. 咀嚼习惯 B. 左侧颞下颌关节 C. 神经肌肉
D. 右侧颞下颌关节 E. 牙合
9. 关于侧牙合描述错误的是：
A. 咀嚼中工作侧牙接触，非工作侧牙轻或不接触
B. 咀嚼中工作侧与非工作侧牙均不接触
C. 青壮年一般工作侧仅尖牙接触
D. 侧牙合中，咬合侧称工作侧
E. 全口义齿修复中，要考虑非工作侧牙的咬合接触
10. 下颌后退运动时电位变化较明显的肌肉是：
A. 颞肌、咬肌 B. 咬肌 C. 颞肌后束 D. 颞肌前束 E. 二腹肌前腹
11. 吞咽的基本中枢位于：
A. 脑桥内 B. 丘脑内 C. 延髓内 D. 中脑内 E. 以上都不是
12. 连接左右两侧同名磨牙的颊、舌尖所构成的曲线是：
A. 纵牙合曲线 B. 横牙合曲线 C. 补偿曲线 D. Spee 曲线 E. 牙合平面
13. 以下哪项不参与面部的发育：
A. 额鼻突 B. 球状突 C. 上颌突 D. 侧鼻突 E. 腭下降起
14. 以下关于钟状期牙胚的特点，说法错误的是：
A. 钟状期的发育可分为早期和晚期，出现牙体硬组织提示进入了晚期
B. 钟状期牙胚可分为四层
C. 钟状期的凹面形成特定牙冠的最终分化
D. 糜结在帽状期出现，到钟状期时已消失
E. 内釉上皮层和外釉上皮层汇合形成颈环

15. 齿小皮是指：
A. 新萌出牙表面有机薄膜膜 B. 牙表面一层糖蛋白 C. 牙颈部唾液薄
D. 齿上皮 E. 成齿细胞退变
16. 牙髓的神经中主要分布在髓角，并引起尖锐疼痛的神经纤维是：
A. A- α 纤维 B. A- β 纤维 C. A- δ 纤维 D. C 纤维 E. C 和 D 皆可
17. 以下哪一项不是结合上皮的特征：
A. 钉突较短 B. 无角化 C. 胞浆中张力细丝较少
D. 细胞间的桥粒较少 E. 在龈沟底部约 10 层细胞
18. 以下哪项不是肌上皮细胞的特点：
A. 光镜下可见细胞发出 4-8 支分支状突起，形似篮子，又称蓝细胞
B. 胞浆内含有活性很强的碳酸酐酶活性
C. 电镜下可见细胞突起内充满纵行排列的细丝，称肌微丝
D. 细胞内含肌动蛋白和肌球蛋白，具有收缩功能
E. 主要位于腺泡及闰管的外表面、腺泡和小导管的腺上皮与基膜之间
19. 关于牙本质龋，以下哪项是错误的：
A. 与釉质龋相比，其发展较快
B. 最先侵入的细菌可能是产酸菌
C. 细菌侵入时可沿牙本质小管的侧支小管扩展
D. 常形成一底向内、顶向外并稍圆突的三角形病损
E. 由病损深部向表面分为透明层、脱钙层、细菌侵入层和坏死崩解层
20. 以下关于根尖周炎的说法，正确的是：
A. 急性根尖周炎患者的疼痛不受温度变化影响，不能准确定位
B. 引发根尖周炎的细菌主要是以需氧菌为主的混合感染
C. 刺激强度高、机体抵抗力弱时，表现为以增生为主的慢性炎症
D. 急性根尖周炎镜下可见泡沫细胞、增生性的上皮团块等结构
E. 化脓性根尖周炎最常见的引流途径是形成骨膜下脓肿
21. 以下哪项不属于活动期牙周炎的病理变化：
A. 吸收陷窝区可见新的类骨质形成
B. 结合上皮向根方增殖，形成深牙周袋，周围有密集的淋巴细胞浸润
C. 牙槽骨可见破骨细胞性骨吸收陷窝，牙槽骨吸收、破坏
D. 牙周膜的基质及胶原变性、降解，牙周膜间隙增宽
E. 沟内上皮及结合上皮下方的胶原纤维变性水肿，大部分被炎细胞取代
22. 以下哪一项病理变化提示疱疹病毒感染：
A. 上皮棘层增生 B. 上皮内形成水疱 C. 角化层内形成微小脓肿
D. 上皮气球样变，胞核内有嗜伊红性的小体 E. 上皮出现不典型增生

23. 镜下表现为涎腺组织被密集的淋巴细胞取代，小叶周边残存腺泡，小叶内缺乏纤维组织修复，并可见上皮团块。首选诊断为：
A. 急性涎腺炎 B. 涎腺萎缩 C. 慢性复发性涎腺炎
D. 慢性硬化性唾液腺炎 E. 舍格伦综合征
24. 镜下见肿瘤细胞以乳头状生长为特点，可见纤细的纤维血管轴心，表面及黏膜下层出现不成熟的基底样、多形性细胞，考虑为：
A. 鳞状细胞乳头状瘤 B. 乳头状增生 C. 乳头状鳞状细胞癌
D. 腺样鳞状细胞癌 E. 疣状癌
25. 下列水门汀中不宜直接用于深龋洞的衬层和垫底的是：
A. 氧化锌丁香酚水门汀 B. 磷酸锌水门汀 C. 聚羧酸锌水门汀
D. 氢氧化钙水门汀 E. 玻璃离子水门汀
26. 有关龋损的过程，以下说法正确的是：
A. 是连续的脱矿过程
B. 再矿化时反应物质常先在深部组织中扩散沉积
C. 脱矿与再矿化交替出现
D. 先出现有机物分解，然后无机物脱矿
E. 破坏的牙体硬组织可以自行修复
27. 多生牙最常发生于：
A. 下颌磨牙 B. 下颌前牙 C. 下颌前磨牙 D. 上颌前牙 E. 上颌前磨牙
28. 牙槽骨水平吸收时形成的牙周袋通常为：
A. 骨上袋 B. 骨内袋 C. 复杂袋 D. 1壁骨袋 E. 4壁骨袋
29. 关于龈沟液以下说法不正确的是：
A. 牙龈健康者极少有龈沟液
B. 炎症时龈沟液明显增多
C. 其主要成分与血清相似
D. 龈沟液中有免疫球蛋白具有抗特异性致病菌作用
E. 龈沟液中无白细胞等防御细胞
30. 用钝头牙周探针探测牙周炎患者的炎症牙龈时，探针终止于：
A. 进入结合上皮 1/2~1/3 B. 穿透结合上皮，终止于正常结缔组织的冠方
C. 终止于正常结缔组织纤维内 D. 龈沟底 E. 终止于结合上皮的冠方
31. 关于灼口综合征，以下说法错误的是：
A. 该病多见于更年期妇女 B. 患者以舌烧灼样疼痛为主
C. 临床检查无明显的阳性体征 D. 疼痛特征为晨重晚轻的时间节律性改变
E. 治疗需考虑精神心理因素的影响

32. 与 HIV 感染后免疫抑制有关的最常见的口腔表现是：
A. Kaposi 肉瘤 B. 口腔念珠菌病 C. 带状疱疹 D. 毛状白斑 E. 非霍奇金淋巴瘤
33. 以下病变可表现为萎缩性舌炎，哪一项除外：
A. 烟酸缺乏症 B. Vit B2 缺乏症
C. 叶酸缺乏所致巨幼细胞性贫血 D. Vit C 缺乏症 E. 缺铁性贫血
34. 以下有明显呼吸抑制作用的全麻药物是：
A. 芬太尼 B. 依托咪酯 C. 地西泮 D. 异丙酚 E. 丁卡因
35. 男，50岁，拔除下颌第一磨牙，新鲜血液充盈牙槽窝，但不能淹没牙根间隔，正确的处理是：
A. 缝合拔牙窝 B. 咬除牙根间隔 C. 碘仿纱布覆盖
D. 明胶海绵覆盖 E. 任其吸收
36. 下列关于种植体理想植入位置的描述那个不合适：
A. 保留舌侧骨板至少 1mm B. 保留颊侧骨板至少 2mm
C. 距上颌窦底至少 1mm D. 距神经管至少 2mm
E. 种植体之间至少 2mm
37. 以下那种伤口不是放置引流的适应症：
A. 可能发生感染的污染创口 B. 留有死创的创口 C. 较浅的无菌创口
D. 止血不全的创口 E. 脓肿切开的创口
38. 消毒切口的碘酊的浓度是：
A. 0.5% B. 1.0% C. 1.5% D. 2.0% E. 2.5%
39. 上颌骨高位骨折出现脑脊液耳漏时，对下述哪类颅脑损伤具有诊断意义：
A. 脑挫裂伤 B. 脑震荡 C. 硬膜外血肿 D. 颅前窝骨折 E. 颅中窝骨折
40. 最少发生区域性淋巴结转移的恶性肿瘤：
A. 鳞状细胞癌 B. 腺上皮癌 C. 淋巴上皮癌 D. 基底细胞癌 E. 未分化癌
41. 皮样囊肿和表皮样囊肿的主要区别是：
A. 皮样囊肿内不含角化物 B. 表皮样囊肿内不含角化物
C. 皮样囊肿的囊壁不含皮肤附属结构 D. 表皮样囊肿的囊壁含皮肤附属结构
E. 皮样囊肿的囊壁含一种或多种皮肤附属结构
42. 中厚皮片包括：
A. 表皮层 B. 表皮+部分真皮层 C. 表皮+真皮全层
D. 表皮+真皮+部分皮下组织 E. 表皮+真皮+皮下组织

43. 口腔修复患者的口腔检查不包括：

- A. 颌面各部分之间比例关系是否协调对称
- B. 颞下颌关节活动度及弹响
- C. 影像学检
- D. 模型检查
- E. 牙周治疗

44. 下列哪项不是比色的基本条件和要求

- A. 医师与技师之间应建立良好的交流关系
- B. 去除或避免患者戴用影响比色的干扰物、饰品等
- C. 比色前充分清洁天然牙
- D. 比色板不湿润时比色效果更好
- E. 上午 10 点至下午 3 点在自然光线条件下进行比色最佳

45. 下列哪项不是前牙 PFM 全冠牙体预备的要求

- A. 切缘预备出 1.0~1.5mm 间隙
- B. 唇面除颈缘外从牙体表面均匀磨除 1.2~1.5mm
- C. 邻面去除倒凹，保持适当的切向聚合度 2°~5°
- D. 舌侧均匀磨除 0.8~1.5mm
- E. 唇面边缘于龈下 0.5~0.8mm

46. 以下关于桩核冠设计不正确的是：

- A. 保留不少于 4mm 的根充材料以保证根尖封闭
- B. 保证桩的长度不短于临床牙冠高度
- C. 桩的直径在 1/3~1/2 根径范围内对牙根的抗折性无明显影响
- D. 按桩的表面结构除主动螺纹外，表面纹理对固位力的增加作用并不很明显
- E. 原则上核的边缘与冠边缘之间应留有至少 1.5mm 的牙本质

47. 以下哪个不属于连接体

- A. 前腭杆
- B. 侧腭杆
- C. U 型腭板
- D. RPI
- E. 唇杆

48. 关于隙卡沟的预备，以下哪点不正确：

- A. 隙卡沟位于基牙与邻牙的外展隙区
- B. 预备时不要破坏邻接触点
- C. 铸造卡环的间隙一般不少于 2mm
- D. 弯制开环的间隙一般为 1mm
- E. 沟底要与卡环丝的圆形一致而不是楔形

49. 关于无牙颌印模的边缘要求哪项不正确：

- A. 上颌后缘两侧盖过上颌结节到翼上颌切迹
- B. 上颌后缘与后颤动线（或腭小凹前 2mm）一致
- C. 下颌后缘盖过磨牙后垫的 1/2 或全部
- D. 远中舌侧边缘向远中伸展到下颌舌骨后间隙
- E. 下缘跨过下颌舌骨嵴

50. 全口义齿后牙排牙注意事项正确的是：

- A. 后牙的功能尖为下颌第一前磨牙颊尖，上第二前磨牙舌尖及上磨牙近中舌尖
- B. 后牙的功能尖为下颌第一前磨牙颊尖，上第二前磨牙舌尖及上磨牙远中舌尖
- C. 在任何方向水平运动时，所有功能尖不能有咬合干扰
- D. 下牙弓较短，可减数排牙，如减去一个磨牙
- E. 当上下牙槽嵴的连线与牙合平面的交角是 80° 或略小，仍可排成正常牙合，不用减小后牙覆盖

51. 以下哪点不是咬合病的病因：

- A. 早接触
- B. 牙合干扰
- C. 牙合过度磨耗
- D. 牙周疾病引起的牙合的形态和功能异常
- E. 头晕、耳鸣

52. 上颌乳尖牙的近中和远中出现间隙称为：

- A. 生长间隙
- B. 灵长间隙
- C. 替牙间隙
- D. 可用间隙
- E. 必须间隙

53. 正常乳牙牙合的特征是：

- A. 有剩余间隙
- B. 乳尖牙为远中关系
- C. 前牙覆盖深
- D. 终末平面以垂直型及远中型为多
- E. 以上均不正确

54. 估计牙弓后段每年每侧增量为：

- A. 0.5 mm
- B. 1.0 mm
- C. 1.5 mm
- D. 2.0 mm
- E. 2.5 mm

55. Wits 值是用于分析：

- A. 上颌骨对颅部的位置关系
- B. 下颌骨对颅部的位置关系
- C. 上、下颌骨前部的相互位置关系
- D. 下颌骨的凸缩度
- E. 上颌骨对整个面部侧面的关系

56. 面角代表：

- A. 下颌的凸缩度
- B. 面部的生长发育的方向
- C. 上颌骨相对于颅骨的位置关系
- D. 上下颌骨之间的相互位置关系
- E. 面部的高度

57. 颌间支抗是指：

- A. 支抗牙与矫治牙在同一牙弓内利用支抗牙作为支抗而使矫治牙移动
- B. 以枕部颈部、头顶部等作为支抗进行牙移动
- C. 以上颌(上牙弓)或下颌(下牙弓)作为支抗来矫治对颌牙齿或是调整位关系
- D. 利用种植体作为支抗来移动牙齿
- E. 以上均不正确

58. 颅部和面部的容量比在出生时是：

- A. 8:1
- B. 6:1
- C. 4:1
- D. 2:1
- E. 1:1

59.牙周病正畸治疗的方法是：

- A.牙周病的治疗多用口外弓增加支抗，关闭前牙间隙
- B.对于牙槽骨吸收的患者，常减小冠根比以利于正畸治疗牙槽骨改建
- C.牙周病正畸治疗后常选用正位器作为保持器
- D.牙周病的正畸治疗应矫正每个位置不正的错位牙
- E.牙周病的正畸治疗少用片段弓技术

60.直丝弓矫治器的托槽，根据不同牙齿的位置，在槽沟上加入了不同的近远中倾斜角度(tip)，此角度依据的是：

- A.临床牙冠
- B.解剖牙冠
- C.根长
- D.整个牙长轴
- E.以上都有关

三、论述题（共 12 题，共 120 分）

1. 论述牙冠轴面形态的生理意义（9 分）
2. 试述唇部的组织学结构，包括各结构的分层及其特点（9 分）
3. 论述牙周病治疗程序（9 分）
4. 论述急性根尖周炎可能的排脓途径（9 分）
5. 随着种植技术的发展，论述上颌窦内体升技术的常见手术方式（9 分）
6. 论述口底多间隙感染的治疗（9 分）
7. 阐述 Kennedy 二类牙列缺损的义齿设计要点是什么？（9 分）
8. 固定桥修复体出现松动或脱落的原因及解决办法有哪些？（9 分）
9. 论述骨性错牙合的主要病因？（9 分）
10. 论述颌骨的可塑性与正畸治疗的关系（9 分）
11. 论述 intercuspal position 的特点及其意义（15 分）
12. 论述牙源性角化囊肿的病理特点及其与复发的关系（15 分）