



暨南大学
JINAN UNIVERSITY

2025 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题（A 卷）

招生专业与代码：护理/护理学

105400/101100

考试科目名称及代码：护理综合 308

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、单项选择题（下列每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最合适的答案写在答题纸上，共 50 题，每题 1 分，共 50 分）

1. 干咳或刺激性咳嗽常见于（ ）
 - A. 急性或慢性咽喉炎
 - B. 慢性支气管炎
 - C. 支气管扩张症
 - D. 肺炎
 - E. 肺脓肿
2. 急性心包炎主要的症状是（ ）
 - A. 发热
 - B. 胸闷
 - C. 胸骨后、心前区疼痛
 - D. 心悸
 - E. 呼吸困难
3. 心房颤动常见于（ ）
 - A. 急性心肌梗死
 - B. 糖尿病
 - C. 神经衰弱
 - D. 甲状腺功能亢进性心脏病
 - E. 电解质紊乱
4. 颅脑手术后患者头部翻转过剧可发生（ ）
 - A. 颈椎损伤
 - B. 脑溢血
 - C. 脑栓塞
 - D. 脑疝
 - E. 蛛网膜下腔出血
5. “脑梗死”最常见和基本的病因是（ ）
 - A. 脑淀粉样血管
 - B. 糖尿病
 - C. 高脂血症
 - D. 脑动脉炎
 - E. 脑动脉粥样硬化
6. 胰岛素治疗适应症是（ ）
 - A. 1 型糖尿病

- B. 糖尿病伴严重感染
C. 围手术期高血糖
D. 2 型糖尿病早期血糖过高者
E. 以上均是
7. 患者，男，48 岁，乙型肝炎病毒相关性肝硬化失代偿期。近日出现意识不清，言语含糊，性格改变。实验室检查：血氨 $145 \mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是（ ）
A. 肝性脑病
B. 上消化道出血
C. 急性脑梗死
D. 电解质紊乱
E. 威尔逊病
8. 系统性红斑狼疮患者出现下列哪项表现提示疾病处于活动期（ ）
A. 关节疼痛
B. 蝶形红斑
C. 口腔溃疡
D. 补体 C3、C4 降低
E. 抗核抗体阳性
9. 类风湿关节炎最早的症状是（ ）
A. 晨僵
B. 关节痛与压痛
C. 关节肿胀
D. 关节畸形
E. 关节活动障碍
10. 关于不稳定型心绞痛的描述，错误的是（ ）
A. 是介于稳定型心绞痛和心肌梗死之间的临床综合征
B. 静息时也可发生发作
C. 硝酸甘油舌下含服效果差
D. 心电图 ST 段改变具有特异性
E. 心肌标志物可轻度升高
11. 下列哪项不是肾病综合征的主要临床表现（ ）
A. 大量蛋白尿
B. 低蛋白血症
C. 高脂血症
D. 全身性水肿
E. 血尿
12. 关于高血压急症的治疗原则，错误的是（ ）
A. 1 小时内平均动脉压降低幅度不超过治疗前水平的 25%
B. 2~6 小时内将血压降至 160/100mmHg 左右
C. 首选速效、可控性强的静脉降压药
D. 使用强力利尿剂辅助降压
E. 持续监测血压变化
13. 以下哪项是上消化道出血常见的病因（ ）
A. 消化性溃疡
B. 反流性食管炎

- C. 急性感染性疾病
D. 尿毒症
E. 风湿性疾病
14. 患者，女，42岁，诊断为急性髓系白血病，化疗后第7天出现发热39.5℃，全身乏力，WBC $0.5 \times 10^9/L$ 。以下护理措施中最重要的是（ ）
- A. 预防出血
B. 防治感染
C. 营养支持
D. 心理护理
E. 皮肤护理
15. 患者，男，78岁。既往有糖尿病史30余年，今晨起床时发现右侧肢体无力，言语不清，家人急送医院，急诊以“脑梗死”收治入院。查体：神志清楚，右上肢能自行抬离床面，但不能对抗阻力，右下肢无法抬起，但能左右平移，该患者右侧上下肢的肌力分别是（ ）。
- A. 右上肢5级，右下肢3级
B. 右上肢4级，右下肢2级
C. 右上肢3级，右下肢2级
D. 右上肢3级，右下肢1级
E. 右上肢2级，右下肢1级
16. 患者，男，65岁，因腹痛、呕吐2天入院。诊断为肠梗阻后行胃肠减压治疗，护士在操作过程中发现引流液突然转为血性。请问该患者最可能进展为（ ）
- A. 肠套叠
B. 绞窄性肠梗阻
C. 麻痹性肠梗阻
D. 痉挛性肠梗阻
E. 黏连性肠梗阻
17. 患者，女，50岁，因左侧乳房肿块2月就诊。体检发现左乳外上象限可及4.0cm×3.0cm肿块，质地坚硬，活动度差，局部皮肤呈现典型的酒窝样改变。该体征出现是因为（ ）
- A. 肿瘤侵犯大乳管
B. 肿瘤与胸肌粘连
C. 肿瘤堵塞皮下淋巴管
D. 肿瘤侵犯胸膜
E. 肿瘤侵犯Cooper韧带
18. 患者，男，45岁，因车祸致多发伤入院，诊断为失血性休克。在抗休克治疗中体表灌流情况的标志是（ ）
- A. 精神状态
B. 皮肤温度、色泽
C. 血压
D. 心率
E. 尿量
19. 患者，女，40岁，因车祸致上腹部闭合性损伤2小时入院。查体：面色苍白，四肢湿冷，BP 75/45mmHg，P 130次/分。B超示腹腔积液。最可能的诊断是（ ）
- A. 胃穿孔
B. 十二指肠穿孔
C. 肝脾破裂

- D. 腹壁软组织损伤
- E. 胰腺破裂
20. 患者，男，35岁，CT示颅内肿物，近日神志恍惚、语无伦次、躁动不安、答非所问，此情况属（ ）
- A. 精神错乱
- B. 意识模糊
- C. 谵妄
- D. 狂躁
- E. 浅昏迷
21. 患者，男，25岁，因高处坠落致多发伤。查体：呼吸困难，颈静脉怒张，气管偏向健侧，患侧叩诊呈鼓音。同时合并四肢骨折、肺挫伤等，应首先处理的紧急情况是（ ）
- A. 张力性气胸
- B. 四肢骨折
- C. 肺挫伤
- D. 肋骨骨折
- E. 肾挫伤
22. 患者，男，42岁，因十二指肠溃疡穿孔就诊。医生决定先行保守治疗，此期间最重要的护理措施是（ ）
- A. 半卧位
- B. 输液
- C. 胃肠减压
- D. 应用抗生素
- E. 做术前准备
23. 患者，男，35岁，因急性肠梗阻频繁呕吐，出现口渴、尿少、口唇粘膜干燥、眼窝凹陷、血压偏低。在补液治疗过程中，最需要警惕的电解质紊乱是（ ）
- A. 高钙血症
- B. 低钾血症
- C. 高钠血症
- D. 高氯血症
- E. 低镁血症
24. 关于颅内压增高患者吸氧叙述不正确的是（ ）
- A. 增加 PaO_2
- B. 降低颅内压
- C. 减少脑血流量
- D. 降低 PaCO_2 ，使脑血管舒张，脑血容量增多
- E. 降低 PaCO_2 ，使脑血管收缩，脑血容量减少
25. 患者，女，52岁，同种异体肾移植术后7天，肾区闷胀感、压痛。查体：T 38.9℃，P 102次/分，BP 169/98mmHg，尿量减少至25ml/h，血肌酐 600mmol/L。首先考虑该患者出现了（ ）
- A. 感染
- B. 出血
- C. 急性排斥反应
- D. 肾动脉血栓形成
- E. 急性肾小管坏死
26. 患者，男，29岁，翻越座椅不慎失足，会阴部骑跨在木质座椅椅背上，主诉伤后会阴部剧

痛，不能自行排尿，急诊就医。查体：面色苍白，P 104 次/分，BP 110/70mmHg，呼吸急促；会阴部皮下淤血；导尿管不能插入膀胱。血常规和下腹部 X 线未见异常。目前该患者最首要解决的护理诊断/问题是（ ）

- A. 焦虑
- B. 疼痛
- C. 血尿
- D. 排尿困难
- E. 血容量不足

27. 患者，女，26 岁，因左前臂双骨折行闭合复位后石膏管型固定，当日晚上出现左前臂肿胀疼痛逐渐加重手部皮肤发白，皮温降低，牵拉手指时剧痛。此时护士应警惕该患者是否发生了（ ）

- A. 局部感染
- B. 软组织损伤
- C. 急性骨萎缩
- D. 脂肪栓塞综合征
- E. 骨筋膜室综合征

28. 腰椎间盘突出症术后患者体位护理正确的是（ ）

- A. 2h 后通过轴线翻身侧卧
- B. 2h 后通过轴线翻身俯卧
- C. 4h 后通过轴线翻身侧卧
- D. 6h 后通过轴线翻身俯卧
- E. 6h 后通过轴线翻身侧卧

29. 患者，女，28 岁，因幽门梗阻频繁呕吐 1 天收入院。查体：口渴、尿少、眼窝凹陷，BP：90/60mmHg。该患者最可能出现的脱水类型是（ ）

- A. 等渗性脱水
- B. 原发性脱水
- C. 低渗性脱水
- D. 继发性脱水
- E. 高渗性脱水

30. 患者，女，20 岁，因右下腹转移性疼痛 1 天就诊。查体：麦氏点固定压痛，WBC $12.5 \times 10^9/L$ 。诊断为阑尾炎后给予保守治疗，3 天后腹痛有所缓解，但今晨突然出现剧烈腹痛，范围扩大至全腹，伴恶心呕吐。最可能出现的情况是（ ）

- A. 阑尾周围脓肿
- B. 急性单纯性阑尾炎
- C. 急性化脓性阑尾炎
- D. 急性坏疽穿孔性阑尾炎
- E. 慢性阑尾炎

31. 护士接触患者后脱下隔离衣的正确步骤是（ ）

- A. 消毒手，解袖扣，解领扣，脱衣袖，解腰带，脱去隔离衣
- B. 解袖扣，消毒手，解领扣，脱衣袖，解腰带，脱去隔离衣
- C. 解袖扣，消毒手，解领扣，解腰带，脱衣袖，脱去隔离衣
- D. 消毒手，解袖扣，解腰带，解领扣，脱衣袖，脱去隔离衣
- E. 解腰带，解袖扣，消毒手，解领扣，脱衣袖，脱去隔离衣

32. 脑出血并发脑疝时，瞳孔的变化是（ ）

- A. 双侧瞳孔变小
B. 双侧瞳孔变大
C. 双侧瞳孔不等大
D. 双侧瞳孔散大固定
E. 双侧瞳孔无变化
33. 在为患者大量输入库存血后易导致出血倾向的发病机制是（ ）
A. 血中血小板破坏
B. 血钙降低
C. 酸性增高
D. 钾离子浓度增高
E. 血钙升高
34. 接受破伤风抗毒素脱敏注射的患者出现轻微反应时，护士应采取的正确措施是（ ）
A. 立即停止注射，迅速给予抢救处理
B. 立即报告医生
C. 重新开始脱敏注射
D. 停止注射，待反应消退后，减少剂量增加注射次数
E. 注射苯海拉明抗过敏
35. 患者，男，65岁，因过量服用巴比妥类药物而中毒，患者出现潮式呼吸。潮式呼吸的特点是（ ）
A. 呼吸暂停，呼吸减弱，呼吸增强反复出现
B. 呼吸减弱，呼吸增强，呼吸暂停反复出现
C. 呼吸浅慢，逐渐加快加深再变浅慢，呼吸暂停，周而复始
D. 呼吸深快，呼吸暂停，呼吸浅慢，三者交替出现
E. 呼吸深快，逐步浅慢，以至暂停，反复出现
36. 患者，女，27岁，怀孕9个月，无诱因出现阴道流水2小时急诊入院，诊断为胎膜早破，此患者应采取的卧位是（ ）
A. 头高脚低位
B. 去枕平卧位
C. 头低脚高位
D. 仰卧屈膝位
E. 膝胸卧位
37. 患者，男，66岁，车祸撞伤脑部，出血后出现深昏迷，脑干反射消失，脑电波消失，无自主呼吸，患者以上表现应属于（ ）
A. 濒死期
B. 临床死亡期
C. 生物学死亡期
D. 疾病晚期
E. 脑死亡期
38. 患者，男，56岁，因肺炎应用抗生素数周，近日发现口腔黏膜有乳白色片状分泌物，护士为其行口腔护理时应注意观察（ ）
A. 口腔有无异味
B. 口唇有无干裂
C. 牙龈有无肿胀出血
D. 有无真菌感染

- E. 黏膜有无溃疡
39. 刘护士，23 岁，在肿瘤科病房工作，某日为患者配制化疗药物，因药瓶内压力过大，药物溅到刘护士眼睛内，刘护士应立即（ ）
- A. 用肥皂水清洗眼睛
 - B. 用高渗盐水清洗眼睛
 - C. 用低渗盐水清洗眼睛
 - D. 用弱酸溶液清洗眼睛
 - E. 用清水清洗眼睛
40. 患者，男，56 岁，患消化道溃疡多年，今突然呕血约 800ml，入院后立即给予输血，输入 10ml 后患者主诉头痛、发热、四肢麻木、腰背部剧烈疼痛伴胸闷、气促。护士应首先考虑患者发生了（ ）
- A. 发热反应
 - B. 过敏反应
 - C. 溶血反应
 - D. 空气栓塞
 - E. 急性肺水肿
41. 生物-心理-社会医学模式理论是由谁提出的（ ）
- A. 恩格尔
 - B. 霍姆斯
 - C. 马斯洛
 - D. 贝塔朗菲
 - E. 奥瑞姆
42. 健康—疾病连续相模式认为（ ）
- A. 健康是相对的而非绝对的
 - B. 安适是人的主观体验
 - C. 信念是人获取健康的基础
 - D. 疾病是客观的功能障碍
 - E. 以上都不是
43. 护理评估中，哪种方法可以直接了解患者的感受和想法（ ）
- A. 观察
 - B. 体检
 - C. 查阅文献
 - D. 交谈
 - E. 实验检查
44. “酸葡萄效应”属于以下哪种心理防御机制（ ）
- A. 转移
 - B. 否认
 - C. 合理化
 - D. 投射
 - E. 认同
45. 患者，女，39 岁，今早将送手术室在麻醉下行“甲状腺次全切除术”，以下是患者手术前出现的反应，不属于压力反应的是（ ）
- A. 呼吸急促
 - B. 心跳加快

- C. 紧张害怕
 - D. 频繁想上厕所
 - E. 声音嘶哑
46. 沟通交流的最高层次是（ ）
- A. 一般性沟通
 - B. 情感性沟通
 - C. 事务性沟通
 - D. 共鸣性沟通
 - E. 分享性沟通
47. 根据弗洛伊德的性心理发展理论，产生各种心理活动的原动力是（ ）
- A. 意识
 - B. 潜意识
 - C. 前意识
 - D. 无意识
 - E. 自我意识
48. “判断患者的健康问题及原因或诱因，并做出护理诊断”，体现护士的角色是（ ）
- A. 决策者
 - B. 计划者
 - C. 沟通者
 - D. 协调者
 - E. 教育者
49. 以下不属于患者角色适应不良的是（ ）
- A. 角色行为替代
 - B. 角色行为强化
 - C. 角色行为减退
 - D. 角色行为冲突
 - E. 角色行为异常
50. 护士小张，参加工作第一年，她认为自己已经掌握了护理学相关知识与技能，只要严格按照常规和指南操作，就能为患者有效地护理。护士小张处于评判性思维的哪个层次（ ）
- A. 基础层次
 - B. 机械层次
 - C. 尽职层次
 - D. 复杂层次
 - E. 高级层次

二、多项选择题（下列每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择所有正确的答案写在答题纸上，多选或少选均不得分，共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

1. 胸部叩击促进有效排痰，以下叙述正确的是（ ）
- A. 禁用于肺栓塞、严重胸壁疼痛
 - B. 叩击时患者取侧卧位或坐位
 - C. 叩击前需明确痰液滞留的位置
 - D. 每次叩击时间以 3~5 分钟为宜
 - E. 应安排在餐后 2 小时至下一餐前 30 分钟完成
2. 患者，女，45 岁，行胃大部分切除术后第 1 天。关于早期离床活动的意义，正确的包括（ ）

- A. 减少肺部并发症
 - B. 有益于血液循环, 防止血栓形成
 - C. 促进胃肠功能恢复
 - D. 促进排尿功能恢复
 - E. 预防伤口裂开
3. 患者, 男, 60 岁, 因原发性肝癌拟行肝叶切除术, 预防术后肝昏迷的措施包括 ()
- A. 术前使用护肝药物
 - B. 术前应用维生素 K
 - C. 术前用肥皂液灌肠
 - D. 术后吸氧
 - E. 保持大便通畅
4. 以下促进护患双方有效沟通的行为有 ()
- A. 观察患者反应
 - B. 及时反馈
 - C. 全神贯注地倾听
 - D. 不中途打断谈话
 - E. 及时更正患者不正确的观念
5. 小陈, 女, 24 岁, 护理本科毕业后被分配到某医院外科病区工作, 小陈每天工作都小心谨慎, 十分担心出差错, 与同事的人际关系也比较紧张, 小陈面临的工作压力源有 ()
- A. 躯体性
 - B. 心理性
 - C. 社会性
 - D. 生理性
 - E. 生物性

三、简答题 (共 6 题, 每题 15 分, 共 90 分)

1. 试述帕金森病的主要临床表现和健康教育内容。
2. 简述急性胰腺炎的常见病因及保守治疗的主要护理措施。
3. 试述开放性气胸的紧急处理措施。
4. 简述烧伤患者的临床分期及急救措施。
5. 简述医院感染源的类型有哪些。
6. 护理模式与护理理论有什么区别? (11 分) 请分别列举两个护理模式及护理理论名称。(4 分)

四、分析题 (共 5 题, 每题 30 分, 共 150 分)

1. 患者, 男, 48 岁, 因急性心肌梗死入院治疗。患者平时身体健康, 无重大疾病史, 但近期因工作压力大, 生活不规律, 出现胸痛、呼吸困难等症状, 被诊断为急性心肌梗死。入院后, 患者情绪低落, 对治疗缺乏信心, 对医护人员的询问也显得不耐烦。请问:
 - (1) 根据马斯洛的人类基本需要层次论, 分析患者当前的需要层次及其表现。(15 分)
 - (2) 结合马斯洛的人类基本需要层次论, 制定针对患者的个性化护理计划, 并解释如何满足其各层次的需要。(15 分)
2. 患者, 男, 45 岁, 因“上腹痛伴黑便 3 天”入院。患者 3 天前无明显诱因出现上腹部持续性疼痛, 疼痛呈烧灼感, 伴有反酸、嗝气, 同时出现黑便。既往有消化性溃疡病史 5 年, 常因

工作繁忙导致饮食不规律，近期因工作压力大，溃疡症状加重。入院查体：T 36.7℃，P 100次/分，BP 100/65mmHg，神志清楚，面色苍白，腹部平软，上腹部压痛，无反跳痛。实验室检查：HGB 85g/L，便潜血（+++）。胃镜检查：胃窦部见约 1.5cm×1.0cm 溃疡，基底有活动性出血。请问：

- (1) 此患者最可能出现了什么情况？并阐明判断依据？（10 分）
- (2) 该患者有哪些主要护理问题？（至少列出 3 项）（5 分）
- (3) 针对该患者的护理问题制定相应的护理措施。（10 分）
- (4) 如何对该患者开展出院后健康教育。（5 分）

3. 患者，男，68 岁。患者 5 天前无明显诱因出现胸闷、心悸、气喘，伴双下肢水肿。诉食欲下降，尿量明显减少，夜间常常憋醒，睡眠差。拟“急性心力衰竭”收治心血管内科。既往有冠心病病史 20 年，无家族史，否认疫区旅居史及传染性疾病预防接触史，无外伤手术史。身体评估：T 37.1℃，P 112 次/分，R 28 次/分，Bp 125/75mmHg。喜坐于床边，颈静脉怒张，双下肢膝盖以下明显凹陷性水肿。请问：

- (1) 该患者主要的护理诊断和依据是什么？主要的护理措施有哪些？（15 分）
- (2) 患者入院后第 2 天晚间突发呼吸困难，频频咳嗽，咳粉红色泡沫痰，挣扎坐起，端坐呼吸，烦躁不安。患者可能发生了什么病情变化？如何紧急处理？（15 分）

4. 患者，女，22 岁，因感情受挫服了安眠药，被同屋室友发现，立即将昏迷不醒的患者送往医院，护士及时实施抢救工作。请问：

- (1) 护士该为患者选择哪种合适的洗胃溶液？（5 分）
- (2) 简述洗胃的注意事项。（15 分）
- (3) 洗胃过程中若有血性液体流出，护士应采取何种护理措施？（10 分）

5. 患者，男，57 岁，肝区隐痛 6 个月，伴食欲减退、消瘦、乏力入院。有慢性肝炎史 20 余年。查体：贫血貌，肝右下缘可触及，质硬，轻度压痛。实验室检查甲胎蛋白阳性，B 超和 CT 检查发现肝右叶单个 6.0cm×6.0cm 占位，肝肾功能基本正常。

请问：

- (1) 该患者可能的诊断是什么？（6 分）
- (2) 该患者术前存在哪些主要护理诊断/问题？（12 分）
- (3) 术前应给予该患者哪些护理措施？（12 分）