



2025 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题 A 卷

招生专业与代码：口腔医学（专业学位） 105200

考试科目名称及代码：口腔综合 352

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一、名词解释（共 20 题，每题 3 分，共 60 分）

1. 横嵴 2. 下颌姿势位 3. periodontal potential 4. 小开口运动
5. 发育期根端复合体 6. 罩牙本质 7. 牙髓坏疽 8. Intraepithelial blister
9. Osteodentin 10. 药物性牙龈肥大 11. GTR 12. Model surgery
13. 种植体的生物学宽度 14. Osseointegration 15. Inlay 16. 混合支持式义齿
17. 全口义齿的平衡骀 18. 替牙间隙 19. 自然保持 20. 阻断矫治

二、单项选择题（共 44 题，每题 2 分，共 88 分）

1. 上颌第一前磨牙颊尖与舌尖的偏向是：
A. 偏近中 B. 偏远中 C. 颊尖偏远中，舌尖偏近中
D. 颊尖偏远中，舌尖偏远中 E. 两尖无偏斜，居正中
2. 咀嚼运动的意义不包括：
A. 促进发育和消化功能 B. 粉碎食物，增强味觉 C. 自洁作用
D. 满足食欲 E. 进食的最好途径
3. 下列关于上颌中切牙牙体长轴与中线相交形成的角度的描述，不正确的是：
A. 较上颌尖牙与中线相交的角度大
B. 上颌侧切牙与中线相交的角度小
C. 较上颌前磨牙与中线相交的角度大
D. 较上颌第一磨牙与中线相交的角度大
E. 上颌中切牙较正或稍向近中倾斜
4. 下列关于下颌切牙与上颌切牙的区别不正确的是：
A. 下颌切牙牙冠较狭小
B. 下颌切牙牙冠唇面光滑，发育沟不明显
C. 下颌切牙牙根窄而扁
D. 下颌切牙的切嵴靠近牙体长轴
E. 下颌切牙舌面边缘嵴明显，舌窝较深
5. 下颌处于休息状态时，上下牙弓自然分开成一楔形间隙称：
A. 邻间隙 B. 息止骀间隙 C. 灵长类间隙 D. 颌间距离 E. 垂直距离

6. 有关牙列殆曲线的形态特征，下列说法不正确的是：
- A. 尖牙和第一前磨牙位于牙弓的转弯处
 - B. 连接下颌切牙的切缘、尖牙牙尖、前磨牙颊尖、磨牙颊尖，形成一条凹向上的弧形线
 - C. 连接上颌切牙的切缘、尖牙牙尖、前磨牙颊尖、磨牙颊尖，形成一条凸向下的曲线
 - D. 连接上颌两侧同名磨牙的颊尖、舌尖，形成一条凸向上的弧形线
 - E. 连接上颌两侧同名磨牙的颊尖、舌尖，形成一条凸向下的弧形线
7. 长正中所指的滑动距离是：
- A. 由下颌后退接触自如直向后滑到牙尖交错位
 - B. 由牙尖交错位向前滑到下颌后退接触位
 - C. 由下颌后退接触向前滑到牙尖交错位
 - D. 由牙尖交错位自如地直向前滑到下颌后退接触位
 - E. 由下颌后退接触自如地直向前滑到牙尖交错位
8. 患儿，男，5岁，发现所有乳牙均已萌出，无龋坏。以下不符合这一年龄段殆关系特点的是：
- A. 牙齿排列不紧密
 - B. 切缘和牙合面可见少量磨耗
 - C. 上下颌的乳磨牙有牙合接触
 - D. 下颌第二乳磨牙在上颌第二乳磨牙的近中达一个牙尖
 - E. 下颌第二乳磨牙与上颌第二乳磨牙的远中面平齐
9. 钟状期牙胚片状的牙板向内凹陷形成的充满结缔组织的腔隙为：
- A. 无釉柱牙釉质
 - B. 釉板
 - C. 釉索
 - D. 釉龕
 - E. 釉结
10. 修复性牙本质是：
- A. 在成牙本质细胞和矿化牙本质之间，是一层未钙化的牙本质
 - B. 牙釉质表面因磨损、酸蚀、龋病等而遭受破坏时，部分成牙本质细胞继续形成的牙本质
 - C. 在冠部靠近牙釉质和根部靠近牙骨质最先形成的牙本质
 - D. 牙齿发育完成后形成的牙本质
 - E. 钙化程度最高的牙本质
11. 紧邻牙釉质最早形成的是：
- A. 继发性牙本质
 - B. 罩牙本质
 - C. 透明牙本质
 - D. 前期牙本质
 - E. 托姆斯颗粒层
12. 包埋在固有牙槽骨内的一段牙周膜纤维是：
- A. 穿通纤维
 - B. 越隔纤维
 - C. 牙槽嵴纤维
 - D. 水平纤维
 - E. 根间纤维

13. 牙釉质龋最前沿的改变是:

- A. 表层 B. 病损体部 C. 透明层 D. 暗层 E. 修复性牙本质

14. 患者, 女, 44 岁。口腔黏膜反复破溃 2 个月。检查见腭部及牙龈多处鲜红糜烂区。活检标本见表层上皮大部分缺失, 局部固有层结缔组织表面附着一层基底细胞。该患者最可能的诊断是:

- A. 黏膜类天疱疮 B. 寻常型天疱疮 C. 疱疹性龈口炎
D. 萎缩型扁平苔藓 E. 复发性阿弗他溃疡

15. 口腔癌中, 肿瘤细胞可同时表达上皮和间叶两种标记的肿瘤:

- A. 疣状癌 B. 基底细胞样鳞状细胞癌 C. 乳头状鳞状细胞癌
D. 腺鳞癌 E. 梭形细胞鳞状细胞癌

16. 患者, 男, 50 岁。右下颌磨牙区牙龈肿物, 未见骨质破坏。镜下表现为较致密纤维结缔组织中肿瘤上皮巢连接成网, 瘤巢周边的立方或柱状细胞, 核呈栅栏状排列并远离基底膜, 瘤巢中央细胞呈多角形或星形, 类似于星网状层细胞。该患者最可能的病理诊断是:

- A. 牙源性纤维瘤 B. 单囊型成釉细胞瘤 C. 外周型成釉细胞瘤
D. 牙源性钙化上皮瘤 E. 牙本质生成性影细胞瘤

17. “根柱”是指:

- A. 尖牙粗壮的牙根 B. 发生分叉的牙根 C. 多根牙牙根未分叉部分
D. 根分叉到根尖的部分 E. 截面接近圆形的牙根

18. 控制下颌运动的诸因素中最活跃的因素是:

- A. 牙合 B. 神经反射 C. 颞下颌关节骨质改变 D. 肌肉收缩 E. 关节盘移位

19. 以浆液性腺泡为主的混合性唾液腺是:

- A. 腮腺 B. 下颌下腺 C. 舌下腺 D. 腭腺 E. 味腺

20. 被称为无淋巴间质的 Warthin 瘤的是:

- A. 囊腺瘤 B. 嗜酸性腺瘤 C. 小管状腺瘤 D. 皮脂腺腺瘤 E. 以上都不正确

21. 以下不属于导致牙髓根尖周病物理因素的是:

- A. 磨牙症 B. 牙体预备产热 C. 激光
D. 消毒药物 E. 电流

22. 根尖周肉芽组织内增生的上皮团中心细胞变性, 坏死, 液化, 有可能形成:

- A. 慢性牙髓炎 B. 慢性根尖脓肿 C. 根尖周囊肿
D. 致密性骨炎 E. 急性根尖周炎

23. 以下关于掌跖角化-牙周破坏综合征的描述，错误的是：

- A. 皮损及牙周病变常在 4 岁前共同出现
- B. 患儿智力及身体发育迟缓
- C. 乳牙萌出后不久即可发生牙周破坏
- D. 恒牙萌出后按序发生牙周破坏
- E. 手掌、足底、膝部及肘部皮肤局限性的过度角化

24. 牙髓治疗过程中或治疗后造成牙周病变的原因不包括：

- A. 根管壁侧穿 B. 髓室底穿通 C. 髓腔或根管内封入烈性药
- D. 牙根纵裂 E. 弯曲根管

25. 根管治疗过程中根管预备机用器械不包括：

- A. Profile 器械 B. P 钻 C. K 锉 D. G 钻 E. 长柄球钻

26. 蔗糖诱导牙菌斑生物膜形成过程中的关键成分是：

- A. 葡糖醛酸 B. 蔗糖 C. 葡聚糖 D. 果糖 E. 葡糖基转移酶

27. 下颌骨骨折，骨折段移位的最重要影响因素是

- A. 咀嚼肌的牵拉作用
- B. 骨折部位
- C. 骨折线走形方向
- D. 骨折段是否有牙
- E. 外力大小与方向

28. 最少发生区域性淋巴结转移的恶性肿瘤是

- A. 鳞状细胞癌
- B. 基底细胞癌
- C. 淋巴上皮癌
- D. 腺上皮癌
- E. 未分化癌

29. 男，30 岁，左下颌骨体部中枢性血管瘤出血，急诊入院，该患者最佳治疗方案为

- A. 即刻手术切除病变下颌骨
- B. 硬化剂注射止血
- C. 栓塞后手术治疗
- D. 局部压迫止血
- E. 严密观察

30. 成人腮腺造影，造影剂注入量

- A. 2.5ml B. 2ml C. 3ml D. 1.5ml E. 0.5ml

31.三叉神经功能检查不包括

- A. 感觉功能 B. 味觉功能 C. 角膜反射 D. 腭反射 E. 运动功能

32.单纯的上颌前突主要与下列哪项畸形相鉴别

- A. 下颌真性前突 B. 开颌畸形 C. 偏突颌畸形
D. 上颌后缩 E. 小下颌畸形

33. 嵌体预备时常见的辅助固位形不包括

- A. 邻面片切面 B. 沟形固位形 C. 倒凹固位形 D. 骀面鸠尾 E. 洞固位形

34. 可摘局部义齿腭侧基托过长，不密合，可能会导致

- A. 义齿弹跳 B. 基牙敏感，咬合不适 C. 义齿摘戴困难
D. 支托折断，义齿下沉 E. 发音不清

35. 固定桥粘固后患者感到胀痛不适的原因为

- A. 咬合过高 B. 基牙受扭力，接触点过紧 C. 桥体龈端接触过紧
D. 粘固剂过厚 E. 基牙负担加重

36. 下列关于种植体折断的说法不正确的是

- A. 根据患者具体情况选择合适的种植体可有效预防种植体折断
B. 减少损伤因素可预防种植体折断
C. 一旦出现折断，一般要取出原种植体
D. 若无临床症状的情况下也可完全保留于骨内
E. 常伴有种植体实际骨结合长度不足

37. 下列有关全口义齿基托伸展的正确叙述是

- A. 越大越好，可以增加固位面积
B. 短些好，避免影响肌肉系带的运动而影响固位
C. 过长过短都会影响固位
D. 长一些好，戴牙时再调整
E. 无所谓，长短不会对固位造成影响

38. 下列关于印模材料说法错误的是

- A. 硅橡胶印模材料操作简便，取出需保持在有一定湿度的环境中
B. 藻酸盐印模材料缺点是印模形态稳定性和准确性较差
C. 藻酸盐印模材料优点是富有弹性，从倒凹中取出时不易变形
D. 硅橡胶印模材料制取的印模清晰精确，尺寸稳定性更佳
E. 藻酸盐印模从口中取出后，应即时灌注模型

39. 当矫治器作用力通过牙齿的阻抗中心时，牙齿会发生哪种形式的移动

- A. 整体移动 B. 转矩移动 C. 倾斜移动 D. 旋转移动 E. 伸长移动

40. Twin-block 矫治器的上牙合垫于第二前磨牙处与殆平面形成的角度通常为

- A. 30° B. 40° C. 45° D. 50° E. 60°

41. 下列关于牙周病患者正畸治疗的原则，不正确的是

- A. 尽量选择减小牙齿移动量的方案，以减少对牙周组织改建的影响以及继发性的牙槽骨吸收，在治疗过程中尽可能运用轻力与间歇力，适当延长复诊周期，为牙槽骨的改建提供时间
B. 牙槽骨丧失的患者，托槽定位应该尽量靠近殆方，减少非控制性倾斜移动
C. 牙周病患牙可延迟进入加力系统，延迟牙周病患牙的托槽粘接和施力
D. 牙周病患牙要施加轻力，单颗牙齿 0.49~1.96N (5~20g)
E. 降低系统力值，可使用自锁托槽，降低系统摩擦力

42. 一般微螺钉种植体支抗植入后可以加力的时间是

- A. 即刻 B. 1 天 C. 1 周 D. 2 周 E. 1 个月

43. 两种方丝弓矫治器的槽沟宽度分别为

- A. 0.018 英寸和 0.022 英寸
B. 0.016 英寸和 0.018 英寸
C. 0.016 英寸和 0.022 英寸
D. 0.019 英寸和 0.021 英寸
E. 0.018 英寸和 0.020 英寸

44. 有关成年人正畸矫治力使用的说法，正确的是

- A. 重力 B. 持续力 C. 间歇重力 D. 持续轻力 E. 延长复诊时间

三、论述题（共 12 题，共 152 分）

1. 论述上颌第二前磨牙和上颌第一前磨牙的外形区别（12 分）。
2. 论述牙髓的结构、临床意义。（12 分）
3. 论述充填后引起牙周性疼痛的原因及处理。（12 分）
4. 论述附着水平及其临床意义。（12 分）
5. 论述三叉神经痛治疗中卡马西平的用药方法及不良反应。（12 分）
6. 论述睡眠呼吸障碍的并发症。（12 分）
7. 论述全冠修复体就位的标志（12 分）
8. 牙列缺失有哪些修复方式？传统全口义齿与种植全口义齿如何选择？（12 分）
9. X 线头影测量在正畸领域中的主要应用有哪些？（12 分）
10. 论述早期矫治的特点。（12 分）
11. 论述牙尖交错殆正常的标志。（16 分）
12. 论述根尖囊肿、根尖肉芽肿和根尖脓肿的 X 线及病理表现的特点。（16 分）